

Passiflora hatschbachii Cervi 1994
Subgenus *Passiflora* Supersection *Stipulata* Section
Granadillastrum

Distribution: Brazil (states of Rio de Janeiro, Minas Gerais and Espírito Santo).

Planta escandente, totalmente pubescente, com tricomas alvos, suaves e macios. Caule cilíndrico. Estípulas setáceas, de 5 mm, decíduas. Pecíolos de 2,5-3 cm, com um par de glândulas sésseis próxima da base da lâmina foliar. Folhas trilobadas; lóbulos ovalados (lóbulo médio de 7-8 × 1,5-2,5 cm), agudos no ápice e com um pequeno mucrón, de 2-3 mm; cordadas na base, trinervadas e levemente serreadas nos bordos, membranáceas. A distância entre os ápices dos lóbulos laterais é de 9-10 cm. Pedúnculos de 8,5-10 cm, robustos, articulados próximo da base floral. Brácteas em número de três, verticiladas, situadas a 6 mm das base floral; ovaladas, de 2 cm × 8 mm, na base; acuminadas no ápice; o terço inferior de borda inteira e os dois terços superiores de borda denteada. Flores de 9-10 cm de diâmetro. Tubo do cálice campanulado, de 1 cm, com máculas marrons. Sépalas oblongas, de 3 cm × 6 mm, dorsalmente e próximo ao ápice, corniculadas, corno pubescente de 5-7 mm; na face abaxial, máculas marrons e numerosas glândulas sésseis esparcidas por toda a superfície. Pétalas oblongas, de 2 cm × 3 mm, alvas. Corona de filamentos em duas séries de filamentos filiformes, distanciadas 4 mm; a série exterior, de 1,2 cm, a interior de 2 mm. Opérculo de 4 mm, ereto, membranáceo no terço inferior e filamentosos nos dois terços superiores. Limen cupuliforme, de 3,5 mm, envolvendo frouxamente a base do androginóforo. Ovário ovóide, densamente pubescente, com tricomas alvos. Fruto ovóide, aveludado, de 6,5 × 5,3 cm. Semente ovaladas, de 6 × 4 mm, reticuladas.

